



5. OBVESTILO O VARSTVU SADIK SOLATE - 07.02.2018 13:49 - Zaključeno



Padavica sadik (*Pythium* spp.)

Pri pridelavi sadik solate se za omejevanje okužb s **padavico sadik** svetuje uporabo pripravkov **Previcur Energy** ali **Prestop**.

Previcur Energy

Solato, ki je gojena v organskem substratu se zaliva v odmerku 3 ml/m². Uporabi se 2 do 4 L raztopine za m² površine (20.000 – 40.000 L/ha). Tretira se lahko največ dvakrat v sezoni v presledku 10 do 14 dni. Prvič po setvi, pred vznikom in drugič po vzniku sejancev, vendar najkasneje pred presajanjem. Pripravek je namenjen uporabi v zavarovanih prostorih. Karenca pripravka za solato je 21 dni.

Bodite pozorni na karenco pripravka! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Prestop

Pri sejančkih in sadih vrtnin za zatiranje povzročiteljev padavice sadik se pripravek uporablja:

- v odmerku 200-500 g na m³ kot dodatek rastnemu substratu (pred presajanjem), ali
- v odmerku 5-10 g na 1-2 litra vode (v 0,5 % koncentraciji) na 1 m² z zalivanjem ali škropljenjem; v enem rastnem ciklusu so dovoljena največ 4 tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi na osnovi mikroorganizma *Gliocladium catenulatum* (sev J1446), ki se jih ponavlja v 3 do 4 tedenskih razmiki.
- v odmerku 200-500 g na 1000 rastlin preko kapljičnega namakanja, po presajanju ali sajenju rastlin v lončke, ali
- z zalivanjem rastnega substrata posajenih rastlin v 0,5 % koncentraciji, pri čemer veljajo naslednje orientacijske vrednosti:

Volumen koreninske grude (premer lonca)	Volumen (L) 0,5 % suspenzije za 1000 rastlin	Odmerek sredstva (g), potreben za 1000 rastlin
100 ml (6 cm)	4 do 10	20 do 50
250 ml (9 cm)	10 do 25	50 do 125
500 ml (11 cm)	20 do 50	100 do 250
1 L (14 cm)	40 do 100	200 do 500

v enem rastnem ciklusu so dovoljena največ 4 tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi na osnovi mikroorganizma *Gliocladium catenulatum* (sev J1446), ki se jih ponavlja v 4 do 6 tedenskih razmiki.

Uporaba pripravka **Prestop** je dovoljena v ekološki pridelavi. Sredstvo se uporablja v zavarovanih prostorih. Karenca ni potrebna.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 07.02.2018 13:49

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

