



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Oljna ogrščica

/ 29. OBVESTILO O VARSTVO OLJNE OGRŠČICE - repičar

29. OBVESTILO O VARSTVO OLJNE OGRŠČICE - repičar - 13.04.2018 08:31 - Zaključeno



OBVESTILO O VARSTVO OLJNE OGRŠČICE

Datum 13. 4. 2018

V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fenofazi individualni cvetni brsti vidni. (BBCH 57). V lovilne rumene posode in na rumene plošče se lovijo predvsem repičarji ter še kljunotaji. Repičarji delajo škodo na cvetnih brstih, opazimo jih tudi na zaprtih socvetjih.

Priporočamo, da preverite posevke oljne ogrščice na prisotnost repičarjev in ukrepate, če je presežen prag škodljivosti.

PRAGOVİ ŠKODLJIVOSTI so naslednji:

- Repičar: 1-2 hrošča/rastlino v fazi razpiranja brstov,
- 2-3 repičarji/rastlino v času nabreklih brstov,
- 4-6 repičarji/rastline pred razcvetanjem prvih cvetov

Škodljivce oljne ogrščice zatiramo z naslednjimi registriranimi pripravki:

- Sintetični Piretroidi: **Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Decis (0,3 l/ha), Decis 100 EC (0,075 l/ha), Gat Decline 2,5 EC (0,3 l/ha), Poleci (0,3 l/ha), Fastac 100EC (0,1 l/ha), Karate zeon 5 CS (0,15 l/ha), Karis 10 CS (0,075 l/ha), Kaiso EG (150 g /ha), Mavrik 240, Evure (0,2 l/ha), Sparviero (0,075 l/ha), Daskor 440 0,625 L/ha**
- Neonikotinoidi: **Biscaya (0,3 l/ha)**
- Pimetrozin: **Chess 50WG (0,15 kg/ha)**

Insekticidi so strupeni za čebele, ko oljna ogrščica cveti jih ni več dovoljeno uporabljati.

Proti glivičnim boleznim oljne ogrščice: bele gnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*), listne pegavosti črne listne pegavosti (*Alternaria spp.*) in drugih priporočamo uporabo fungicidov, registrirani so: **Buzz ultra DF 0,33 kg/ha, Star Tebukonazol (0,5 – 1 L/ha), Folicur EW 250, Tebusha 25% EW 1 l /ha, Tebazon EW 25, Baltazar 1,5-2 l/ha, Orius 25 EW 1 l/ha, Caramba 1,2 l/ha, Mirador forte 1,5-2 l/ha, Propi 25 EC (0,5 l/ha), Tazer 250 SC (1 l/ha), Ortiva (1 l/ha), Mirador 250 SC (1,0 L/ha), Prosaro, (1 l/ha), Score 250 EC (0,5 L/ha), Mavita 250 EC (0,5 l/ha), Acanto plus (1 l/ha), Siman 0,8 L/ha, Zaftra AZT 250 SC (1,0 L/ha).**

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO TER VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS IN HRANITI RAČUNE.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024