

12. OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC - 16.04.2018 14:52 - Zaključeno



Večina sort ameriških borovnic je dosegel stadij razvoja, ko se prvi cvetni popki ločujejo na podaljšajočem grozdju (BBCH 57), vegetativni poganjki pa so v fazi začetka rasti, ko so vidne osi poganjkov (BBCH 31). V tem obdobju so ameriške borovnice zelo občutljive za okužbe z borovničevo monilijo (*Monilinia vaccinii-corymbosi*). Prva plodišča borovničeve monilije so že dozorela, pogoste padavine in razmeroma visoke temperature pa ustvarjajo dobre razmere za primarne okužbe. Pridelovalcem priporočamo, da zavarujete nasade ameriških borovnic s sistemično delujočim pripravkom kot je **Score 250 EC**, **Mavita 250 EC** ali **Folicur EW 250** (slednji lahko povzroči ožige).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 16.04.2018 14:52

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

