

29. VARSTVO VINSKE TRTE - 25.04.2018 14:39 - Zaključeno



Vinska trta se v danih okoljskih razmerah izredno hitro in enakomerno razvija. Odvisno od sorte in lege, imajo trsi lahko razgrnjene že 3 do 5 listkov (13-15 po lestvici BBCH).

Za preventivno zaščito pred **črno pegavostjo vinske trte** svetujemo varstvo s pripravki kot so: **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha), **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (3 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **MIKAL FLASH** (3 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (3 kg/ha). V obdobju padavin je možnost širjenja bolezni velika. Prvo tretiranje opravite, ko so mladike velike 2-5 cm, naslednje naj sledi čez 7 – 8 dni. V poštev prideta tudi bakrova pripravka **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha) in **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pojave **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)** zmanjšate z dodajanjem žveplovih pripravkov: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **VINDEX 80 WG**, ki v odmerku 3 do 8 kg/ha učinkujejo tudi na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo proti **oidiji vinske trte**.

Zatiranje **pršic trsne kodravosti (akarinoze)** in **trsne pršice (erinoze)** pridobiva na pomenu, saj sta vrsti prepoznani za prenašalki virusnega obolenja, ki ga povzroča **Virus vinske trte Sivi pinot (GPGV)**. Znamenja okužbe se kažejo s kržljivostjo, deformacijami rozg in listov ter se med sortami vinske trte lahko precej razlikujejo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 25.04.2018 14:39

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

