

38. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 30.04.2018 08:17 - Zaključeno



Vremenske razmere v drugi polovici aprila so omogočale pojav **bolhačev** na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene v preteklem tednu, saj so rastline po presajanju najbolj občutljive na poškodbe od bolhačev.

Za zatiranje **bolhačev** so na kapusnicah registrirani naslednji insekticidi:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca (dni)	Registriran za: opombe
deltametrin	Decis 100 EC	63 ml/ha	7 dni	Zelje, cvetača, brstični ohrovt. Tretira se ob pojavu prvih škodljivcev S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Izogibati se je treba tretiranju pri visokih temperaturah zraka.
lambda cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15-0,2 L/ha	21 dni	Brstični ohrovt, zelje za listne uši in druge grizoče ter sesajoče žuželke
alfa-cipermetrin	Fastac 100 EC	0,075 L/ha	14 dni	Na kapusnicah (zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu): S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Tretira se, ko je presežen prag škode, pri čemer je potrebno upoštevati karenco. Ne priporoča se tretiranja nad 25°C.

V zadnjem tednu ugotavljamo povečan nalet metuljčkov **kapusove sovke**. Odloženih jajčec in gosenic še nismo odkrili zato priporočamo, da v naslednjih dneh natančno pregledate posevke na prisotnost gosenic. V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica / rastlino) lahko uporabite sledeče insekticide:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca	Registriran za: Opombe:
lambda - cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,2 L/ha	21 dni	Zelje, brstični ohrovt za manjše uporabe v kitajskem zelju in cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni

				sezoni. Sredstvo je nevarno za čebele. Z njim se ne sme tretirati rastlin med cvetenjem.
tebufenozid	Mimic	0,3 - 0,4 l/ha	14 dni	Kapusnice. Škropi se enkrat letno v času, ko se pričnejo izlegati gosenice, višji odmerki pa so namenjeni za uporabo po končanem izleganju gosenic.
indoksakarb	Steward	85 g/ha	3 dni	Zelju, cvetači, brstičnem ohrovту, rdečem zelju in brokoliju. Tretirati se začne med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink. V eni rastni dobi se ga uporablja največ tri krat v razmaku 7 dni.
emamektin	Affirm	1,5 kg/ha	3 dni	Zelje, brokoli in cvetača na prostem. Tretira se od fenološke faze začetka oblikovanja glavic do 3 dni pred pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvo tretiranje se izvede takoj, ko se izležejo prve gosenice in še preden se te zarijejo v glavice. Tretiranje se po potrebi ponavlja v tedenskih razmakih. Sredstvo se sme na istem zemljišču uporabiti največ tri krat v eni rastni dobi.
azadirahthin A	Neemazal-T/S	3,0 L/ha	3 dni	Na zelju, ohrovту in brstičnem ohrovту na prostem. Tretiramo ob pojavu prvih škodljivcev, tretiranje po potrebi čez 7 – 14 dni ponovimo; uporabljamo ga največ 2 krat v eni rastni dobi.
beta-ciflutrin	Bulldock EC 25	0,3 - 0,5 L/ha	7 dni	V glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovту. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni.

<i>Bacillus Thuringhiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>	Lepinox plus	1 kg/ha	Ni potrebna	Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v fazi mladih ličink (prva in druga stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7-10 dni.
lambda-cihalotrin	Karis 10 CS	0,05 L/ha	21 dni za zelje, za brstični ohrovt; 10 dni za listnati ohrovt in brokoli; 7 dni za cvetačo	V brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju (vključno s sorto calabrese) Tretira se, ko je prag škodljivosti presežen. V eni rastni sezoni se ga lahko na istem zemljišču uporabi 2 krat v 10 dnevnem časovnem intervalu.
<i>Bacillus</i> <i>Thuringiensis</i> <i>Var. Aizawai</i>	Agree WG	1 kg/ha.	Ni potrebna	Kapusnice. Prvo tretiranje se opravi, ko se izležejo prve ličinke škodljivih metuljev (od BBCH 09). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.
klorantraniliprol	Coragen Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP	125 mL/ha, ob porabi vode 300 - 800 L/ha	za cvetačo, brokoli, glavnato zelje in ohrovt 1 dan.	Za cvetačo, brokoli, glavnato zelje in ohrovt. Tretira se od fenološke faze razgrnjenega drugega lista do konca rasti (BBCH 12 do 49), ob upoštevanju karence. V cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. Tretira se v času izleganja jajčec oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo izlegati prve ličinke

Na prehranskih vabah so se ujele prve **kapusove muhe**, prav tako smo že odkrili prva odložena jajčeca v klobučevini. Za zatiranje kapusove muhe v Sloveniji ni registriranega pripravka. Priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Priporočamo, da posevke čim prej pokrijete z kopreno (npr. vrteks ali podobni) in s tem preprečite prilet škodljivca.

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024