



46. VARSTVO VINSKE TRTE - 10.05.2018 10:34 - Zaključeno



Vinska trta je na stopnji razvoja sedmih do devetih razprtih listov (17-19 po lestvici BBCH), hkrati so socvetja nabrekla, cvetovi se ločujejo (55-57 po lestvici BBCH).

V začetku maja so bili izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s *peronosporo vinske trte*, zato varstvo vinogradov opravite z enim od preventivno delujočih fungicidov: **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha), **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **DITHANE DG NeoTec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), **UNIVERSALIS** (2 l/ha; deluje tudi na *oidij vinske trte*),... Uporabite lahko tudi kombinirane preventivne pripravke s sistemskim delovanjem na osnovi fosetil-AI: **MOMENTUM F** (4 kg/ha) ali **MIKAL FLASH** (4 kg/ha).

Z dodajanjem **ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV** v odmerku 3 do 8 kg/ha (THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, VINDEK 80 WG,...) zmanjšujete možnost okužb *oidija* in *črne pegavosti vinske trte*. Na oidij občutljivih legah, je smiselno za varstvo uporabiti pripravke kot so **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha) ali **KUSABI** (0,15 l/ha).

Razmike med tretiranjmi lahko v tem obdobju predvidite na 10 dni.

Žveplo učinkuje tudi na pojave *pršic trsne kodravosti (akarinoze)* in *trsne pršice (erinoze)*. Dokaj pogosto zasledimo zlasti napade trsne pršice, katere širjenje preprečite s pripravkom **VERTIMEC PRO** (1 l/ha, oz. 10 ml na 100 m²).

Sredi aprila smo na feromonskih vabah zabeležili prve ulove *grozdnih sukačev*, katerih številčnost se je v prvi dekadi maja izredno povečala. Na legah, kjer se je v preteklih letih redno pojavljala škoda, priporočamo zaščito že proti gosenicam prvega rodu. Za varstvo uporabite pripravke na osnovi *Bacillus thuringiensis* kot je npr. **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.05.2018 10:34

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

