



52. VARSTVO VINSKE TRTE - 16.05.2018 15:37 - Zaključeno



Vinska trta ima, odvisno od sortimenta, mladike dolge 50 do 100 cm. Socvetja so nabrekla, cvetovi se ločujejo (57 po lestvici BBCH). Rast je izredna, saj pogoste padavine in toplo vreme pospešujejo razvoj.

Trenutno nestanovitne vremenske razmere so s pogostimi padavinami hkrati zelo ugodne za razvoj glivičnih bolezni.

Tveganje za okužbe s **peronosporo vinske trte** je veliko. V začetku druge dekade maja smo zasledili tudi prva znamenja bolezni. V tem obdobju je zelo pomembno zaščititi kabrnike. Za varstvo priporočamo pripravke s kombiniranim delovanjem kot so: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (3 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Možna je tudi raba sredstev na osnovi Al-fosetil: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), ki jih je potrebno uporabiti 3× zaporedoma v razmiku 7-10 dni. Slednja dva delujeta le preventivno.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet (Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal Premium, Momentum, Momentum Trio, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F). Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev **tudi bakrovi pripravki**.

Razmike med tretiranjmi v tem obdobju prilagodite intenzivnosti padavin (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 10 dni.

Z dodajanjem **ŽEPLIVIH PRIPRAVKOV** v odmerku 3 do 8 kg/ha zmanjšujete možnost pojavov **oidija** ter **pršic trsne kodravosti (akarinoze)** in **trsne pršice (erinoze)**.

Na legah, kjer povzročča **oidij vinske trte** hude okužbe vsako leto, je za varstvo priporočeno uporabiti pripravke kot so **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,15 l/ha),...

Posebno pozornost namenite tudi legam, kjer pridelek pogosto poškodujejo **grozdni sukači**. Za zaščito pred gosenicami prvega rodu uporabite pripravke na osnovi *Bacillus thuringiensis* kot je npr. **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 16.05.2018 15:37

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

