

## 58. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.05.2018 16:07 - Zaključeno



Vinska trta ima nabrekla socvetja, z ločenimi cvetovi (57 po lestvici BBCH).

Trenutno nestanovitne vremenske razmere so s pogostimi padavinami hkrati zelo ugodne za razvoj glivičnih bolezni. Tveganje za okužbe s **peronosporo vinske trte** je veliko. V začetku druge dekade maja smo zasledili tudi prva znamenja bolezni. V tem obdobju je zelo pomembno zaščititi kabrnike. Za varstvo priporočamo pripravke s kombiniranim delovanjem kot so: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (3 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Možna je tudi raba sredstev na osnovi Al-fosetil: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), ki jih je potrebno uporabiti 3× zaporedoma v razmiku 7-10 dni. Slednja dva delujeta le preventivno.

**V primeru neurja s točo** je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet (Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal Premium, Momentum, Momentum Trio, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F). Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev **tudi bakrovi pripravki**.

Razmike med tretiranjmi v tem obdobju prilagodite intenzivnosti padavin (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslabljena), oz. na 7 - 10 dni.

Z dodajanjem **ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV** v odmerku 3 do 8 kg/ha zmanjšujete možnost pojavov **oidija** ter **pršic trsne kodravosti (akarinoze)** in **trsne pršice (erinoze)**.

Na legah, kjer povzročča **oidij vinske trte** hude okužbe vsako leto, je za varstvo priporočeno uporabiti pripravke kot so **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 - 1,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 – 0,3 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,15 l/ha), **MISHA20 EW** (0,23 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), ...

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 23.05.2018 16:07

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

