93. Varstvo jablan in hrušk - 27.08.2018 13:21 - Zaključeno

V poznem poletnem času se z ohladitvijo ozračja začnejo pojavljati močne rose, ki so ugodne za širjenje številnih glivičnih obolenj, kot je na primer črna listna pegavost jablan. Močno okuženo listje odpade prezgodaj, kar negativno vpliva na kakovost plodov in na diferenciacijo brstov za prihodnje leto. Posebno močne rose lahko pričakujemo v nižinskih legah. Za zaključna škropljenja jabolk priporočamo uporabo sredstev z dobrim delovanjem na skladiščne bolezni kot so **Luna experience** (Karenca= 14 dni), **Bellis** (K= 7 dni), **Pomax** (K= 5 dni) ali **Geoxe** (K= 3 dni). Poznejše sorte pa lahko še naprej varujete z uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. **kaptan** kot so **Merpan 80 WDG**(K= 28 dni)**, Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC** (K= 21 dni) ali **Orthocide 80 WG** (K= 28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek **Vitisan,** ki ima karenco 1 dan.

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Datum objave obvestila: 27.08.2018 13:21
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**
Seznam registriranih FFS