



2. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 07.02.2019 15:12 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmata carpophila*)

Na sončnih legah slovenske Istre in v Brdih so brsti marelic že močno napeti. Pridelovalcem svetujemo, da zgodnje sorte marelic, ki so v fenološki fazi B-C po Baggio liniju ali 51-53 po BBCH lestvici škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu. Za škropljenje nasadov uporabite **bakrene pripravke**.

Sredstvo	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 07.02.2019 15:12

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

