



Zahodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica / Koščičarji

/ 3. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN

3. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN - 14.02.2019 09:15 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigminta carpophila*)

Nasadi marelic na severnem Primorskem prehajajo v fenološko fazo B-C po Baggioliniju ali 51-53 po BBCH lestvici. Sadovnjake škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu. Za škropljenje nasadov uporabite **bakrene pripravke**.

Sredstvo	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigminta carpophila*)

Na izpostavljenih legah so brsti breskev in nektarin že močno napeti. Pridelovalcem priporočamo, da omenjene nasade škropite proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev**. Za škropljenje uporabite **bakrene pripravke**. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Sredstvo	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP	1,8 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 14.02.2019 09:15

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

