

6. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 22.02.2019 12:21 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

V nasadih na izpostavljenih legah se odpirajo prvi cvetovi zgodnjih sort marelic (fenofaza BBCH 59 - 60 ali E po Baggioliniju). Prvo škropljenje proti **cvetni moniliji** je priporočljivo opraviti, ko bo odprtih 10 % cvetov. Za zatiranje bolezni lahko uporabite registrirane pripravke, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
*Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Duaxo koncentrat	V odmerku 15 ml/5l vode oziroma v odmerku 1,1 l na višinski meter krošnje/ha. Najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3 l/ha.
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha
*Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha

*V ekološki pridelavi se lahko uporablja priprava **Amylo-X** in **Serenade Aso**.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 22.02.2019 12:21

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

