



7. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 27.02.2019 07:45 - Zaključeno



Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmia carpophila*)

V priobalnem pasu so se zaradi toplega vremena v preteklem tednu breskve in nektarine razvile nekoliko hitreje. Ob zadnjem pregledu sadovnjakov so bile rastline v fenofazi D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (časn timeri odprti). Proti **breskovi kodravosti** je omenjene nasade priporočljivo poškopiti z **organskimi fungicidi**.

Za zatiranje breskove kodravosti so dovoljeni naslednji organski fungicidi:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Syllit 400 SC	2,25 l/ha
Syllit 544 SC	1,65 l/ha
*Thiram 80 WG	0,2%; največji odmerek 3 kg/ha

*Zaloge v uporabi do 30.4.2019.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škopljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

Nasade na območju severne Primorske, kjer so brsti še zaprti in se še ni zatiralo **breskove kodravosti** in **listne luknjičavosti koščičarjev**, lahko poškopite z **bakrenimi pripravki**. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprblau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprblau Z 35 WP	3 kg/ha
Cuprblau Z Ultra WP	1,8 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Škopimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 27.02.2019 07:45

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

