

13. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 08.03.2019 12:16 - Zaključeno



Breskova kodravost (*Taphrina deformans*)

Nasadi breskev in nektarin postopoma prehajajo v fenofazo D - E po Baggioliniju ali 57 – 60 po BBCH lestvici. Pred napovedanimi padavinami je priporočljivo škropiti proti **breskovi kodravosti**.

Za zatiranje breskove kodravosti lahko uporabite spodnje pripravke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Syllit 400 SC	2,25 l/ha
Syllit 544 SC	1,65 l/ha
*Thiram 80 WG	0,2%; največji odmerek 3 kg/ha

*Zaloge v uporabi do 30.4.2019.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

Datum objave obvestila: 08.03.2019 12:16

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

