



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Pečkarji / 6. VARSTVO JABLAN

6. VARSTVO JABLAN - 15.03.2019 12:22 - Zaključeno



Pečkate sadne vrste so po razvoju na stopnji odpiranja brstov: vidne so že konice zelenih listkov. Zgodnje sorte pa so v stadiju mišjega ušesca (53-54 po lestvici BBCH).

Za preventivno zaščito pred **jablanovim škrlupom** poskrbite s pripravki na osnovi bakra. Tretiranje s tovrstnimi sredstvi je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim povzročiteljem **bolezni lesa** jablane (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,...) in hruške ki nastopajo ob zimski rezi ter drugih fizičnih poškodbah in **hruševemu ožigu**. Uporabite lahko: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (2,5 kg/ha), **KOCIDE 2000** (2,0 kg/ha), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; proti jablanovemu raku in hruševemu ožigu), **BADGE WG** (2,9 kg/ha; proti hruševemu ožigu).

Pri pregledih nasadov na napad **jablanovega cvetožera** sledimo nekaj dni starim izvrtinam, v katere je hrošček začel jajčeca odlagati šele pred kratkim. Trenutno smo jajčeca zasledili v 40% brstov. Priporočamo, da v nasadih oz. predelih nasadov, kjer se škoda pojavlja redno, uporabite **IMIDAN 50 WG** (1 kg/ha; z drugimi pripravki ga ne mešamo; s sredstvom lahko na isti površini zoper jablanovega cvetožera tretirate največ enkrat v eni rastni sezoni; poraba vode je 1000 l/ha). Sredstvo je nevarno za čebele, zato je pred uporabo potrebno poskrbeti za njihovo varnost. Cvetočo podrast je potrebno odstraniti in ga nanesti v času, ko čebele ne letajo. Zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev se sme z njim tretirati do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan. **V ekološki pridelavi** je zoper jablanovega cvetožera predviden **ASSET FIVE** (0,96 l/ha ob porabi vode 1500 l/ha), ki je na osnovi piretrinov in je v letu 2019 dobil dovoljenje UVHVR za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (v RS ga smejo uporabljati le poklicni pridelovalci jabolc, ki imajo nasade napadene s škodljivimi organizmi in imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine; **prodaja se neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji**). Nanesemo ga v večernem času, ko čebele ne letajo.

Pri izvedbi zaščite upoštevajte, da se sredstvi proti jablanovemu cvetožeru z bakrovimi pripravki ne mešata.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo.

Datum objave obvestila: 15.03.2019 12:22

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

