

7. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 15.03.2019 12:30 - Zaključeno



Breskve in nektarine

Breskve in nektarine so na območju Celjske in Koroške regije v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi D (BBCH 55 – 56).

Nevarnost za okužbe z breskovo kodravostjo še ni minila. Ob padavinah bodo izpolnjeni pogoji za okužbe.

Zato svetujemo, da še enkrat opravite škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki kot so: **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha), **Syllit 544 SC** (1,65 L/ha) ali **Tiram 80 WG** (0,2 %; največji odmerek 3 kg/ha, zaloge v uporabi do 30.4.)

Vartsvo marelic

Marelice so v fenološki fazi stadija balona E2 (BBCH 59) do začetka cvetenja BBCH 61. V primeru dežja opravite prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje pa, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi.

V dovoljenih odmerkih lahko pripravke kot so: Amylo-X, Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Prolectus, Switch 62,6 WG, Signum, Serenade ASO ali Topsin – M.

Datum objave obvestila: 15.03.2019 12:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

