

20. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 15.03.2019 18:02 - Zaključeno



Škrlup

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške povečini v fenofazi mišjega ušesa oz. stadija vidnih cvetnih popkov (BBCH 54-55). Zgodnje sorte hrušk pa so že v fenofazi rožnatih popkov (BBCH 57). Pred napovedanimi padavinami je potrebno nasade poškropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi.

Uporabite lahko:

Sredstvo	Odmerek, konc.	Odmerek, konc.
	HRUŠKA	JABLANA
Dithane M-45	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Dithane DG Neotec	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil 75 WG	-	2,0 kg/ha
Manfil 80 WP	-	2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Avtar 75 NT	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG	2,0 kg /ha	2,0 kg /ha
Penncozeb 75 DG	-	2,5 kg/ha
Pinozeb M-45	-	2 kg/ha
Merpan 80 WDG	1,88 kg/ha	1,88 kg/ha
Scab 80 WG	1,9 kg/ha	1,9 kg/ha
Scab 480 SC	3,13 L/ha	3,13 L/ha
Orthocide 80 WG	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Polyram DF	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Delan 700 WG	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha
Delan Pro	2,5 L/ha	2,5 L/ha
Syllit	1,9 L/ha	1,9 L/ha
Syllit 544 SC	1,4 L/ha	1,4 L/ha

Nasadi jablan na Primorskem so v zelo različnih fenoloških fazah, odvisno območja, sorte in lege. V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so povečini v fazi mišjega ušesa (BBCH 54), na Tolminskem ter v Brkinih v fazi odpiranja brstov (BBCH 53). Zaradi nevarnosti okužb s škrlupom, svetujemo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi. V Brkinih in na Tolminskem je zdaj pravi čas za uporabo sredstev na osnovi bakra.

Uporabite lahko:

Sredstvo	Odmerek, konc.
Badge WG WG	2,9 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3,0 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	3,0 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP	2,0 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP	2,5 kg/ha
Kocide 2000	2,0 kg/ha

Nordox 75 WG	1,6 kg/ha
--------------	-----------

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti **hruševemu ožigu**, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

V nasadih hrušk, ki so že v fenofazi mišjega ušesa priporočamo, da pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje s kontaktnimi fungicidi.

Ameriški kapar (*Diaspidiotus perniciosus*)

V obdobju po brstenju pečkarjev je pravi čas za zatiranje **ameriškega kaparja**. V nasadih hrušk in jablan, kjer je prišlo do prerazmnožitve omenjenega škodljivca, lahko opravite zatiranje s pripravkom **Harpun** v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji, pri porabi od 800 do 1000 L /ha. Največji dovoljeni odmerek sredstva je 0,5 L/ha.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 15.03.2019 18:02

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

