

22. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 21.03.2019 14:49 - Zaključeno



Pavje oko in oljkova siva pegavost

Oljkarjem priporočamo, da po opravljeni rezi oljčnike preventivno poškrbijo proti glivični bolezni **pavjemu očesu**. V kolikor predvidevajo, da se bo čas rezi razvlekel lahko oljke poškrbijo pred pričetkom rezi. Pri tem lahko uporabijo naslednje pripravke:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau Z 50 WP	1,4 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau Z ultra WP	1,8 kg/ha
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha
- folpet	Folpan 50 SC	3,2 l/ha
- dodin	Syllit 400 SC	2,25L/ha
- tebukonazol + trifloksistrobin	Nativo 75 WG	0,25 kg/ha
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha
- difenkonazol	Mavita 250 EC	0,5 l/ha

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki **oljkove sive pegavosti** so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).

Bakreni pripravki delujejo proti obema boleznima, sočasno razkužijo pri rezi nastale rane in ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice **oljkovega raka**.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravi: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 21.03.2019 14:49

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravi: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

