



11. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 25.03.2019 12:19 - Zaključeno



Razvoj pečkatih sadnih vrst je po pridelovalnih območjih precej različen. Na najtoplejših območjih in legah jablane in hruške že vstopajo v fazo cvetenja, med tem ko na hladnejših območjih komaj brstijo. V nasadih, kjer je razvoj počasnejši, je še vedno priporočljiva uporaba bakrovih pripravkov kot so **Badge WG**, **Cuprablau Z35 WP**, **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 50 WP**, **Cuprablau Z ultra WP**, **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**. V nasadih, kjer so jablane že bolj razvite, pa lahko za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite dotikalne pripravke kot so **Antracol**, **Antracol WG 70**, **Avtar 75 NT**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 WG**, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, **Thiram 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga** (dovoljenje za nujne primere za 120 dni, pripravek je dovoljen tudi v ekološki pridelavi).

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Biotip sulfo 800 SC**, **Pol-Sulphur 800 SC** ali **Symbiotica Fito – tekoče žveplo**. Žveplov pripravek so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Kjer so jablane in hruške počasnejše v razvoju je do razvojne faze mišjega ušesa še priporočljiva preventivna raba parafinskega olja (**Frutapon** in **Ovitex**) z namenom zatiranja škodljivcev kot so **listne uši**, **navadna pršica**, **rdeča sadna pršica**, **ameriški kapar** in drugi. Oba pripravka sta primerna tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem potrebno opraviti zatiranje s pripravkom **Harpun**. Sredstvo ima stransko delovanje tudi na hruševo bolšico.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvrčajo **hrušve bolšice**. Uporabite lahko pripravke kot so **Cutisan**, **Malusan** ali **Surround WP**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 25.03.2019 12:19

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

