

12. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 26.03.2019 14:46 - Zaključeno



Brstenje pri jablanah in hruškah napreduje. V povprečju so jablane in hruške na stopnjah od zelenih do rožnih popkov (56-57 po lestvici BBCH).

V naravi smo do sedaj zabeležili že nekaj izbruhov zimskih spor **jablanovega škrlupa**, ki še niso imeli možnosti uspešne okužbe. Z nadaljnjim razpiranjem brstov bo ob padavinah in toplejšem vremenu teh možnosti več. Pri preventivnem varstvu nasadov poskrbite, da bo novo razprta površina listkov ustrezno pokrita z nanosom dotikalnih fungicidov. Uporabite lahko: **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **DITHANE DG Neotec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha; le jablana), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha; le jablana), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2,5 kg/ha; le jablana), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha; le jablana), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **ANTRACOL** (0,2 % konc.; zaloge v uporabi do 22.06.2019), **ANTRACOL WG 70** (0,2 % konc.; zaloge v uporabi do 22.06.2019), **THIRAM 80 WG** (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti; zaloge v uporabi do 30.04.2019),... V primeru dolgotrajnejšega dežja pridejo v bolj razvitih nasadih v poštev tudi pripravki z določenim zdravilnim učinkovanjem; kot so: **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha), oz. **CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA** (6 l/ha; le pri registriranih pridelovalcih).

Dodajanje **žveplovih pripravkov** bo prišlo proti **jablanovi pepelovki** v poštev, ko bodo temperature ozračja ponovno dosegale 15 in več °C.

Topli dnevi v II. dekadi meseca marca so spodbudili aktivnost različnih škodljivih vrst žuželk, od katerih dajemo v nasadih hrušk največji poudarek **hruševim bolšicam**. Bolj izpostavljeni so mlajši nasadi, kjer je do cvetenja smiselno proti izlegajočim ličinkam uporabiti pripravek **HARPUN** (1 l/ha). V vsakem primeru svetujemo tudi nadaljevanje **metode odvrčanje** z nanosom **kaolinskih glin**, (ob povečani porabi vode [700-1000 l/ha]; npr. **CUTISAN** ali **MALUSAN** v odmerku 30 kg/ha).

V nasadih jablan bodite pozorni na nalet **vrtnih zavrtačev**, hroščkov iz skupine podlubnikov. Priporočamo namestitve **alkoholnih pasti** z **lepljivimi ploščami**: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>.

Hkrati pridelovalce opozarjamo še na pravočasno namestitve feromonskih razpršilcev za **metodo zbejanja**, saj se določene vrste **zavijačev** v nasadih pojavljajo že nekaj dni.

Spremljajte še prve pojave **listnih uši**, različne vrste **hroščev rilčkarjev** in **gosenice pedicev**. V primeru prerasnmožitve svetujemo pripravek **NEEMAZAL T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje), katerega prvi nanos opravite pred cvetenjem (drugo tretiranje boste opravili 10 – 14 kasneje, po zaključenem cvetenju).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo.

Datum objave obvestila: 26.03.2019 14:46

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

