

## 28. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 29.03.2019 11:54 - Zaključeno



### Resarji

Zgodnje sorte breskev in nektarin zaključujejo s cvetenjem in postopno prehajajo v fenofazo G po Baggio liniju ali 69 po BBCH lestvici. Ko odpadejo vsi venčni listi je potrebno opraviti škropljenje proti **resarjem**. Slednji lahko povzročijo večjo škodo zlasti v nasadih nektarin. Za zatiranje resarjev na breskvah in nektarinah je dovoljena uporaba pripravkov **Delegate 250 WG** v odmerku 0,3 kg/ha, **Laser Plus** v odmerku 0,25 l/ha in **Naturalis** v odmerku 1,5 l/ha. Pripravka Laser Plus in Naturalis lahko uporabljajo tudi ekološki pridelovalci.

### Listne uši

Po cvetenju opravimo škropljenje proti **listnim ušem**.

Registrirana sredstva za zatiranje listnih uši:

| Sredstvo       | Odmerek ali koncentracija                      |
|----------------|------------------------------------------------|
| Calypso SC 480 | 0,02 %; največji dovoljeni odmerek 0,3 l/ha    |
| Chess 50 WG    | 0,02 %                                         |
| Mospilan 20 SG | 0,025-0,04 %                                   |
| Pirimor 50 WG  | 0,075 %; največji dovoljeni odmerek 0,75 kg/ha |
| Teppeki        | 0,14 kg/ha                                     |

**Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 29.03.2019 11:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

