

18. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 08.04.2019 12:54 - Zaključeno



Na območju Celjske in Koroške regije so srednje pozne in sorte češenj in višenj v fenološki fazi polnega cvetenja BBCH 64 - 65. Zaradi deževnega vremena v časi cvetenja, opravite še eno škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov kot so: **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha) ali **Duaxo koncentrat** (1,1 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 3,3 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* **Amilo -X** (1,5 - 2,5 kg/ha).

Samo za češnje pa lahko proti cvetni moniliji uporabite tudi pripravke kot so: **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1,5 L/ha), **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha) ali **Topsin - M** (1 kg/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus subtilis* **Serenade ASO** (8 L/ha).

Datum objave obvestila: 08.04.2019 12:54

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

