



19. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 08.04.2019 12:55 - Zaključeno



Na območju Celjske in Koroške regije so slive in češplje glede na sorte in lege v povprečju v fenološki fazi polnega cvetenja BBCH 64 - 65. Zaradi deževnega vremena v časi cvetenja, opravite še eno škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha), **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1,5 L/ha), **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), ali **Topsin – M** (1 kg/ha). Uporabite lahko tudi pripravka na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus subtilis* **Serenade ASO** (8 L/ha) ali *Bacillus amyloliquefaciens* **Amilo –X** (1,5 - 2,5 kg/ha).

V primeru, da na bele lepljive plošče ulovite skupaj več kot 30 osic **rumene ali črne češpljene grizlice**, po končanem cvetenju opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravkom **Mospilan 20 SG**, v 0,04 % konc.

Datum objave obvestila: 08.04.2019 12:55

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

