



Zahodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica / Krompir

/ 34. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI

### 34. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI - 11.04.2019 09:54 - Zaključeno



V nižinah Primorske ste že posadili krompir in bo kmalu že vzkalil (če še ni), v višjih legah pa se šele pripravljate na saditev krompirja. Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Mehansko zatiranje plevelov je tudi edino, ki ga lahko uporabijo ekološke kmetije. Pri integrirani pridelavi po potrebi uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja. Priporočamo, da se pri izbiri herbicida držite navodil o uporabi in ste posebej pozorni na fazo rasti krompirja, da ne bi prihajalo do nepotrebnih fitotoksičnosti in zastojev rasti pri krompirju.

#### SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2019

##### PRED VZNIKOM KROMPIRJA

| PRIPRAVEK                                                                                     | ODMEREK             | DELOVANJE, UPORABA                                                                                                                                             | OPOMBE                                                                                                                                                     | K      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>STOMP AQUA*</b><br><br>Pendimetalin<br>- 45,5%<br><br>Do 31.7.2019                         | <b>2,9 l/ha</b>     | Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere vrste širokolistnega plevela<br><br><b>Tretiramo pred vznikom</b>                                             | Seme mora biti dobro prekrito z zemljo. Snovi ni dovoljeno uporabljati v tleh, ki imajo organske mase nad 6%                                               | ČU     |
| <b>ACTIVUS 40 WG*</b><br><br>Pendimetalin<br>- 40%                                            | <b>5,0 kg/ha</b>    | Za enoletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevela<br><br><b>Tretiramo pred vznikom krompirja</b>                                                         | Varnostni pas 40 mod voda 1. in 2. Reda<br><br>Zaloge v uporabi:<br>12.8.2019                                                                              | ČU     |
| <b>SHARPEN 33 EC*</b><br><br>Pendimetalin-<br>33%<br><br>Do 31.7.2019                         | <b>3,0-5,0 l/ha</b> | Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.<br><br><b>Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov</b>                                 | Varnostni pas 30 mob vodah 1. reda in 2. reda.<br><br>Ne tretira se posevka, ki je v stresu.<br><br>Slabo zatira slak.                                     | ČU     |
| <b>SHARPEN 40 SC*</b><br><br>Pendimetalin-<br>40%<br><br>Do 31.7.2019                         | <b>2,5-4,0 l/ha</b> | Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.<br><br><b>Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov</b>                                 | Slabo zatira slak.<br><br>Varnostni pas 30 mob vodah 1. reda in 2. reda.                                                                                   | ČU     |
| <b>STALLION SYNC TEC*</b><br><br>Klomazon -3%<br>+ pendimetalin-<br>33,3%<br><br>Do 31.7.2019 | <b>3,0 l/ha</b>     | Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pimice<br><br><b>Tretiramo čim prej po saditvi do najpozneje 7 dni pred vznikom</b> | <b>Seme mora biti dobro pokrito z zemljo (najmanj 25 mm).</b><br><br>Ne sme se uporabljati v semenskem krompirju.<br>Varnostni pas 20 m do vodnih površin. | ČU     |
| <b>METRIC*</b><br><br>Klomazon – 6%<br>+ Metribuzin-<br>33,3%                                 | <b>1,5 l/ha</b>     | Srakonja, pasje zelišče                                                                                                                                        | <b>Uporabljamo pred vznikom.</b><br><br>Ne smemo uporabljati na tleh, kjer je več kot 10% organske snovi                                                   | ČU     |
|                                                                                               | <b>1,0 l/ha</b>     | Za zatiranje ostalih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |
| <b>SENCOR SC 600*</b>                                                                         | <b>0,75 l/ha</b>    | Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli                                                                                                           | Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda                                                                                                  | 42 dni |

|                                                                   |                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Metribuzin-60%                                                    |                        | Po sajenju pred vznikom                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |        |
| <b>BUZZIN*</b><br>Metribuzin<br>-70 %                             | <b>0,75 kg/ha</b>      | Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaj vrst ozkolistnega plevla<br><b>Tik pred vznikom</b>                                           | Kolobame omejitve!                                                                                                                                       | ČU     |
| <b>PLATEEN WG 41,5 *</b><br>Flufenacet -24%<br>+ metribuzin-17,5% | <b>2,0 – 2,5 kg/ha</b> | Za enoletne ozkolistne in širokolistne plevle<br><b>Pred vznikom krompirja</b>                                                                | Varnosti pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda                                                                                                 | ČU     |
| <b>BOXER*</b><br>Prosulfokarb<br>- 80%<br>do 31.10.2019           | <b>5,0 l/ha</b>        | Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla<br><b>Tik pred vznikom</b>                                                                 | Ne obdelujemo zemlje, dokler krompir ne vznikne                                                                                                          | ČU     |
| <b>PROMAN</b><br>Metobromuron<br>50%                              | <b>3,0 l/ha</b>        | Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov.<br><b>Tretiramo samo pozne in srednje pozne sorte (z več kot 115 dni rasti)</b> | Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 10 m od voda 2. reda.<br>Tretiranega krompirja ne smemo uporabljati za krmno živali!<br><b>Kolobarne omejitve!</b> | ČU     |
| <b>CHALLENGE</b><br>Aklonifen – 60 %                              | <b>4 l/ha</b>          | Za širokolisten in nekaj ozkolistnih plevelov<br><b>Po saditvi pred vznikom krompirja</b>                                                     | Varnostni pas 20 m od voda 1. in 2. reda                                                                                                                 | 90 dni |

#### PO VZNIKU KROMPIRJA

| PRIPRAVEK                                                                | ODMEREK                   | DELOVANJE, UPORABA                                                                                                                        | OPOMBE                                                                                                                                 | K      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>SENCOR SC 600 *</b><br>Metribuzin-60%                                 | <b>0,15 l/ha</b>          | Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni plevli<br><b>Po vzniku krompirja, ko je na glavnem stebelu največ 9 listov (do BBCH 19).</b> | V primeru naknadnega vznika plevla se ponovno tretira (razmak 10-14 dni)<br><b>V fazi od kličnih listov do 2 listov plevla</b>         | 42 dni |
| <b>TAROT 25 WG*</b><br>Rimsulfuron-25 %                                  | <b>40,0 g/ha + močilo</b> | Za zatiranje širokolistnega ter enoletnega ozkolistnega plevla razen navadne kostrebe                                                     | <b>Zatiramo v fazi od 3 listov do najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst krompirja.</b><br><br>Tretiramo, ko ima plevel 2-3 liste | ČU     |
|                                                                          | <b>50,0g/ha + močilo</b>  | Za zatiranje širokolistnega in enoletnega (tudi n. kostreba) ter večletnega ozkolistnega                                                  |                                                                                                                                        |        |
| <b>BASAGRAN</b><br>do 30.6.2019<br><b>BASAGRAN 480*</b><br>Bentazon -48% | <b>1,5-2,0 l/ha</b>       | Za zatiranje eno – in večlet. širokolistnega plevla.<br><b>Uporabljamo, ko je krompir visok največ 10 cm</b>                              | temperatura zraka naj ne presega 25 °C; Za dobro delovanje je potrebno omočiti liste in steblo                                         | 42 dni |

GRAMINICIDI – HERBICIDI PROTI TRAVNIM PLEVELOM

|                                                             |                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ZETROLA =<br/>AGIL 100 EC*</b><br>Propakvizafop<br>- 10% | <b>0,75 – 1,5 l/ha</b>                         | Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov<br><b>V fazi od 3 lista do faze popolne razraščanosti krompirja</b> | Enoletne trave naj bodo v razvojni fazi od 2 listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov)<br><b>V zgodnjem krompirju uporaba ni dovoljena!</b> | 30 dni |
| <b>FOCUS<br/>ULTRA*</b><br>Cikloksidim – 10%                | <b>2,0 l/ha ali 1,0 l/ha + 1,0 l/ha močila</b> | Enoletni ozkolistni plevli in samosevna žita                                                                                 | <b>Tretiramo v fazi od 2 do 9 listov krompirja</b><br>Varnostni pas 15 mod voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda                                          | 56 dni |
|                                                             | <b>4,0 l/ha ali 2,0 l/ha + 2,0 l/ha močila</b> | Večletni ozkolistni plevli                                                                                                   |                                                                                                                                                         |        |
|                                                             |                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |        |
| <b>TARGA<br/>SUPER *</b><br>Kvizalofop-p-etil- 5%           | <b>1,2 l/ha</b>                                | Enoletni ozkolistni plevli<br><b>Od 2 lista do začetka cvetenja krompirja</b>                                                | Tretiranje enoletnih ozkolistnih plevelov od 2 pravih listov do konca razraščanja.                                                                      | 45 dni |
|                                                             | <b>2,0 l/ha</b>                                | Plazeča pirnica                                                                                                              | Tretiranje v razvojni fazi od 4 do 6 listov plevela                                                                                                     |        |
| <b>FUSILADE<br/>FORTE *</b><br>Fluazifop-p-butil- 15 %      | <b>0,8 l/ha</b>                                | Enoletni ozkolistni plevel                                                                                                   | Uporabljamo po vzniku, ko je plevel v fazi 2-4 listov<br>Varnostni pas 20 mod voda<br>Datum veljavnosti 31.12.2019.                                     | 90 dni |
|                                                             | <b>1,3 l/ha</b> (s predhodno obdelavo tal)     | Večletni ozkolistni plevel (divji sirek)                                                                                     |                                                                                                                                                         |        |
|                                                             | <b>1,5 l/ha</b>                                | Večletni ozkolistni plevel (pirnica, pesjak)                                                                                 |                                                                                                                                                         |        |

**K** – karenc, **ČU** – zagotovljena s časom uporabe. Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 10.4.2019, MKGP, URSVHVVR

**Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !**

**Pri herbicidih, kjer je opozorilo o kolobarnih omejitvah, je potrebno v navodilu o uporabi to še posebej preveriti in upoštevati pri setvi naslednjih kultur.**

**Pridelovalce zgodnjega krompirja opozarjamo, da imajo nekateri herbicidi (npr. herbicidi za zatiranje travnih plevelov) dolgo karenc ali pa niso dovoljeni v zgodnjem krompirju (Agil in Zetrola).**

Datum objave obvestila: 11.04.2019 09:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

