



37. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 12.04.2019 15:24 - Zaključeno



Črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*)

Ko poganjki merijo v dolžino od dva do pet centimetrov oz. je vinska trta v fenoloških fazah D do E po Baggjoliniju (10 do 13 po BBCH lestvici) je priporočljivo opraviti škropljenje proti **črni pegavosti vinske trte**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite sredstva, ki so navedena v spodnji tabeli.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Alleato Duo	1,5 kg/ha
Antracol	0,2 %
Antracol WG 70	0,2 %
Cuprblau Z 35 WG	3 kg/ha
Cuprblau Z 35 WP	3 kg/ha
Cuprblau Z Ultra WP	1,8 kg/ha
Follow 80 WG	1,9 kg/ha
Folpan 50 SC	3 l/ha
Folpan 80 WDG	1,9 kg/ha
Mikal Flash	3 kg/ha
Momentum F	3 kg/ha
Polyram DF	0,3 % (največji odmerek 3 kg/ha)
*Red Fox	25-30 l/ha
Universalis	2 l/ha

*Sredstvo Red Fox se uporablja v fenološki fazi konec nabrekanja brsta; brsti nabrekli vendar še ne zeleni (BBCH 03). Sredstvo se ne meša z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

Za zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte lahko uporabimo tudi pripravke na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG v odmerku 2,5-6,25 kg/ha.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 12.04.2019 15:24

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

