

27. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 15.04.2019 15:09 - Zaključeno



Na večini vinorodnih območji po Sloveniji je glavnina sort vinske trte še v fazi brstenja. Ko bodo poganjki dosegli velikost 1-2 cm bo čas za škropljenje proti **črni pegavosti vinske trte**. Gliva okužuje mladice v vlažnem vremenu, za okužbe pa so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. V vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjene bolezni, priporočamo dvakratno škropljenje v razmiku 7-10 dni z enim od registriranih kontaktnih fungicidov kot so **Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG,**

Polyram DF. Uporabite lahko tudi katerega od registriranih **bakrovih pripravkov** ali pripravek **Universalis**, ki hkrati deluje tudi proti **oidiju vinske trte**. Na zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vpliva tudi uporaba **žveplovih pripravkov**, ki poleg tega zavirajo razvoj populacij **pršic trsne kodravosti (akarinoza)** in **trsnih listnih pršic šiškarič (erionza)**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 15.04.2019 15:09

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

