



20. VARSTVO VINSKE TRTE - 16.04.2019 13:42 - Zaključeno



FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi odpiranja brsta, ko so jasno vidne konice zelenih poganjkov BBCH 08. Sorte, ki so hitrejšje v razvoj kot so Chardonnay, Rumeni muškat pa na izpostavljenih legah prehajajo v fazo odpiranja prvega lista. V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fenološki fazi BBCH 05 - 07.

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Pogoj za razvoj črne pegavosti je vlažno, deževno vreme v času začetka rasti mladice. V takšnih razmerah lahko močnejši pojav bolezni pričakujemo predvsem na občutljivih sortah kot so: Šipon, Kerner ali Laški rizling. Za okužbe so najbolj občutljive 3 do 10 cm dolge mladice.

Vremenoslovci v naslednji dneh napovedujejo postopno toplejše in sončno vreme, ki bo ugodno vplivalo na rast in razvoj vinske trte, vendar ne bo ustvarjalo pogojev za razvoj bolezni.

Zato bo v primeru deževnega vremena škropljenje smiselno opraviti samo v vinogradih, ki so bili v preteklem letu močnejše okuženi. Prvo škropljenje se opravi v fenološki fazi BBCH 09 – 11, ko so mladice dolge 1 do 2 cm, drugo pa 7 do 10 dni kasneje. Škropljenje je potrebno opraviti **pred dežjem**, z enim od kontaktnih fungicidov kot so: **Antracol**, **Antracol WG 70** (2 kg/ha); ali pripravki na osnovi aktivne snovi folpet: **Folpan 80 WDG** (1,9 kg/ha), **Follow WG** (1,9 kg/ha) ali **Folpan 50 SC** (3 L/ha); ali uporabite **Polyram DF** (3 kg/ha).

Za prvo škropljenje lahko uporabite tudi enega od bakrovih pripravkov kot so: **Cuprablau Z 35 WG** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha) ali **Cuprablau Z ultra WP** (1,8 kg/ha).

V vinogradih, kjer je bil v preteklem letu močen pojav oidija, namesto naštetih pripravkov v primeru sočasnega zatiranja črne pegavosti uporabite **Universalis** (2 L/ha).

TRSNA KODRAVOST ALI AKARINOZA IN ERINOZA

V fenološki fazi D do E (BBCH 11-13) oziroma, ko so mladice dolge 2 do 5 cm lahko za zatiranje akarinoze in erinoze uporabite pripravek **Vertimec pro** (1L/ha).

Pri sortah, ki so še v fenološki fazi BBCH 05 – 08 pa lahko, v kolikor še niste, za zmanjšanje populacije pršice šiškarice in pršice trsne kodravosti uporabite tudi pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin** ali **Vindex 80 WG**, v odmerku 2,5 do 8 kg/ha ali **Thiovit Jet**, v odmerku 3 do 8 kg/ha.

Opozorilo: Sredstvo **Vertimec pro** je nevarno za čebele. Pred škropljenjem pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarna za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

GROZDNI SUKAČI

V drugi polovici tedna izobesite feromonske vabe za spremljanje grozdnih sukačev še posebej tisti, ki ste vključeni v KOPOP ukrepe. Izobesite vabe za spremljanje obeh vrst sukačev, tako križastega kot pasastega.

Datum objave obvestila: 16.04.2019 13:42

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

