

30. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 24.04.2019 12:21 - Zaključeno



Po končanem cvetenju koščičarjev je priporočljivo spremljati pojave škodljivcev in jih po potrebi zatirati. V nasadih češenj spremljajte pojave črne češnjeve uši, prag zatiranja je presežen, če najdete kolonije uši na več kot 3 odstotkih pogankov. Škodljivca lahko zatirate z insekticidoma **Calypso 480 SC** ali **Movento SC 100**. V nasadih sliv in češpelj, kjer ste s spremljanjem naleta češpljeve grizlice ugotovili presežen prag škodljivost, je potrebno opraviti zatiranje.

Češpljeva grizlica lahko povzroči veliko škode, saj lahko vsaka pagosenica izje tudi 5 plodičev ali več. Za zatiranje češpljeve grizlice ali listnih uši lahko uporabite insekticida kot sta **Mospilan 20 SG** in **Movento SC 100** ali insekticid **Teppeki**, ki deluje samo proti ušem.

V nasadih breskev in nektarin lahko različne škodljivce kot so siva breskova uš in drugi, zatirate z insekticidi kot so **Calypso 480 SC**, **Chess**, **Mospilan 20 SG**, **Pirimor 50 WG** in **Teppeki**.

Datum objave obvestila: 24.04.2019 12:21

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

