

25. VARSTVO VINSKE TRTE - 25.04.2019 12:51 - Zaključeno



FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko so razprt 1. oz. 2. listi (BBCH 11-12). Na izpostavljenih legah pa imajo sorte, ki so hitrejšje v razvoju kot je Chardonnay, razprte 3 liste (BBCH 13). V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fazi razvoja odpiranja brsta (BBCH 08).

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

V času začetka rasti mladice so ob vlažnem in deževnem vremenu izpolnjeni pogoji za razvoj črne pegavosti vinske trte. V takšnih razmerah lahko močnejši pojav bolezni pričakujemo predvsem na občutljivih sortah kot so: Šipon, Kerner ali Laški rizling. Za okužbe so najbolj občutljive 3 do 10 cm dolge mladice.

Vremenoslovci ob koncu tedna napovedujejo nestanovitno vreme s pogostimi padavinami.

Zato samo v vinogradih, ki so bili v preteklem letu močnejše okuženi s to boleznijo pred padavinami opravite prvo škropljenje in ga ponovite čez 7 do 10 dni. Uporabite enega od kontaktnih fungicidov kot so: **Antracol**, **Antracol WG 70** (2 kg/ha); ali pripravke na osnovi aktivne snovi folpet: **Folpan 80 WDG** (1,9 kg/ha), **Follow WG** (1,9 kg/ha) ali **Folpan 50 SC** (3 L/ha); ali uporabite **Polyram DF** (3 kg/ha).

Za prvo škropljenje lahko uporabite tudi enega od bakrovih pripravkov kot so: **Cuprablau Z 35 WG** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha) ali **Cuprablau Z ultra WP** (1,8 kg/ha).

V vinogradih, kjer je bil **v preteklem letu močen pojav oidija**, namesto naštetih pripravkov v primeru sočasnega zatiranja črne pegavosti uporabite **Universalis** (2 L/ha).

TRSNA KODRAVOST ALI AKARINOZA IN ERINOZA

V tem času oziroma, ko so mladice dolge 2 do 5 cm lahko za zatiranje akarinoze in erinoze uporabite pripravek **Vertimec pro** (1L/ha).

Opozorilo: Sredstvo **Vertimec pro** je nevarno za čebele. Pred škropljenjem pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarna za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Datum objave obvestila: 25.04.2019 12:51

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

