



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Stročnice / 27. VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI

## 27. VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI - 26.04.2019 12:36 - Zaključeno



Fižol se v teh dneh seje oziroma so posevki že v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih fižola po setvi pred vznikom fižola in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevele   | Aktivna snov | F  | Odmerek         | Čas uporabe fižol BBCH | Karenca in opombe  |
|---|--------------|----|-----------------|------------------------|--|
| <b>BOXER</b><br>O. in Š. pl.                | prosulfokarb | EC | <b>5,0 L/ha</b> | Preem                  | ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm) |
| <b>CHALLENGE</b><br>Š. in O. pl.            | aklonifen    | SC | <b>4,0 L/ha</b> | Preem<br>BBCH 00-08    | 90 dni, za dobro delovanje je pomembna vлага v tleh                            |
| <b>STOMP AQUA</b><br>E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | CS | <b>2,9 L/ha</b> | Preem                  | ČU,<br><b>manjša uporaba</b>   |

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevele                                 | Aktivna snov  | F  | Odmerek  | Čas uporabe fižol BBCH            | Karenca in opombe  |
|---|---------------|----|--|-----------------------------------|--|
| <b>AGIL 100 EC</b><br>E. in Večl. O. pl                                   | propakvizafop | EC | <b>0,75 – 1,5 L/ha</b>   | Po 13-29                          | 60 dni   |
| * <b>BASAGRAN 480</b> ,<br>* <b>BASAGRAN**</b><br>E. in nek. Večl. Š. pl. | bentazon      | SL | <b>1,0 - 2,0 L/ha v deljeni (split) aplikaciji</b><br>( <b>1,0 + 1,0 L/ha</b> ), med aplikacijama naj bo 7-14 dni                    | Po, do višine posevka največ 5 cm | 42 dni, tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 °C!<br>**zaloge v uporabi do 25.8.2020                        |
| <b>FOCUS ULTRA</b><br>E. O. in samosevci žit<br>Večl. O. pl.              | cikloksidim   | EC | <b>2,0 L/ha oz.</b><br><b>1,0 L/ha+1,0L/ha</b><br>močila DASH HC<br><b>4,0 L/ha oz.</b><br><b>2,0 L/ha+2,0L/ha</b><br>močila DASH HC | Po 12-19<br>Po 12-19              | 56 dni, enoletni oz pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)<br>večletni oz pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15) |
| <b>ZETROLA</b><br>E. in Večl. O. pl                                       | propakvizafop | EC | <b>0,75 – 1,5 L/ha</b>   | Po 13-29                          | 60 dni   |

**Legenda:** **E.** – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, **ČU**- karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

\*FFS - velja omejitve uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 26.04.2019 12:36

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024