

39. OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC - 06.05.2019 10:44 - Zaključeno



Ameriške borovnice so sedaj v fenološki fazi polnega cvetenja ali tik pred cvetenjem, odvisno od sorte. V tem obdobju je potrebno cvetove varovati pred sekundarnimi okužbami z **monilijo ameriških borovnic**. Nestanovitno vreme ustvarja ugodne razmere za okužbe. Pridelovalcem priporočamo, da redno izvajate varstvo borovnic med cvetenjem, z uporabo enega izmed fungicidov kot je **Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Signum, Stroby WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500** ali **Serenade ASO**. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 06.05.2019 10:44

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

