

57. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 07.05.2019 08:42 - Zaključeno

**Navadna sadna gniloba**

Na sončnih legah so nasadi zgodnjih sort češenj in višenj v fenofazah 77 do 81 po BBCH oz. sadeži začenjajo zoreti. Zaradi deževnega vremena obstaja nevarnost za razvoj **navadne sadne gnilobe**. Pred napovedanimi padavinami je zgodnje sorte češenj in višenj priporočljivo škropiti s pripravki iz spodnje tabele.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
*Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha	Karenca ni potrebna
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1 m višine krošnje na ha)	7
Prolectus	400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; skupni odmerek enega škropljenja ne sme preseči 1,2 kg/ha	1
*Serenade Aso	8 l/ha	Karenca ni potrebna
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha	7
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha	7
Teldor SC 500	0,5 l/ha na 1 m višine krošnje; v največjem skupnem odmerku 1,5 l/ha	3

*Sredstvo dovoljeno v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Datum objave obvestila: 07.05.2019 08:42

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

