



59. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 10.05.2019 09:46 - Zaključeno



Pavje oko

Po zadnjih obilnejših padavinah v posameznih oljčnikih na celotne območju pridelave oljk še vedno opažamo močnejši pojav glivične bolezni **pavje oko**. Oljkarjem, kateri v svojih oljčnikih opažajo pojav bolezni, priporočamo da naj prizadeta drevesa pred pričetkom cvetenja še enkrat poškropijo s fungicidom. Sedaj priporočamo predvsem uporabo sredstev na osnovi tebukonazola+trifloksistrobina, folpeta ali difenkonazola. Sicer lahko uporabimo naslednje pripravke:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau-Z 35 WP	2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau Z 50 WP	1,4 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprablau Z ultra WP	1,8 kg/ha
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha
- folpet	Folpan 50 SC	3,2 l/ha
- tebukonazol + trifloksistrobin	Nativo 75 WG	0,25 kg/ha
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha
- difenkonazol	Mavita 250 EC	0,5 l/ha

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Bakreni pripravki delujejo tudi proti **oljkovi sivi pegavosti**, sočasno ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice **oljkovega raka**.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 10.05.2019 09:46

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

Seznam registriranih FFS

