

35. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 10.05.2019 14:35 - Zaključeno



Breskev in nektarine so na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

Pridelovalce opozarjamo na varstvo pred **breskovo pepelovko**. Priporočamo ukrepanje s pripravki na osnovi žvepla (v prahu: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MIKROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **THIOVT JET**, **VINDEX 80 WG** v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: **POL-SULPHUR**, **SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**, **BIOTIP SULFO 800 SC** v odmerku 6 l/ha), oziroma s sredstvi **SERCADIS** (0,15 l/ha) ali **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha).

Pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti **breskovemu škrľupu**, pri katerem beležimo v trenutno deževnem obdobju ugodne pogoje za okužbo.

Spremljajte preraszmnožitve **listnih uši** (med najbolj škodljivimi je **siva breskova uš**) in v zmanjšate njihovo številčnost s pripravki: **TEPPEKI** (0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l na višinski meter krošnje na ha), **CALYPSO 480 SC** (0,3 l/ha), **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.), **CHESS 50 WG** (0,02 % konc.) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelarjem nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.05.2019 14:35

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

