

46. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNE PŠENICE - 20.05.2019 11:45 - Zaključeno



Zaradi dolgotrajnega hladnega vremena poteka razvoj žit počasneje kot je običajno v tem obdobju, hkrati pa stalna vlažnost ustreza razvoju različnih glivičnih bolezni. Ozimne pšenice sedaj bodisi šele začenjajo s klasitvijo ali pa že klasijo in prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte in lege. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimprej, ko bo klasenje zaključeno, zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so **Prosaro**, **Caramba**, **Magnello** in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj **rdečega žitnega strgača**. Na nekaterih lokacijah opažamo številna odložena jajčeca, iz katerih se bodo ob otoplitvi vremena hitro razvile ličinke. Okvirni prag zatiranja je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Biscaya**, **Bulldock 25 EC**, **Fastac 100 EC**, **Decis**, **Karate zeon**, **Kaiso EG**, **Karis 10 SC**, **Sparviero**, **Evure**, **Mavrik 240** in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 20.05.2019 11:45

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

