

51. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 23.05.2019 14:36 - Zaključeno



Posevki pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velika možnost okužb z boleznimi klasa, še posebej fuzarioz žit. Ob napovedanih padavinah se bo nevarnost okužb še dodatno povečala.

Fuzarioze žit v pšenici zatiramo v fazi začetka cvetenja žit, ko opazimo prašnike v sredini klasa, pri ječmenu v začetku klasenja.

Za zatiranje fuzarioz žit so registrirani sledeči pripravki:

AKTIVNA SNOV	PRIPRAVEK	ODMEREK	KARENCA
benzovindiflupir+protiokonazol	Elatus Era (p, pr)	1 l/ha	42 dni
spiroksamin + tebukonazol + triadimenol	Falcon EC 460 (p)	0,6 l / ha	35 dni
tebukonazol	Folicur EW 250 (p)	1 l/ha	42 dni
epoksikonazol + fenpropimorf	Opus 1 (p, j, o, r, pr, t)	1 – 1,5 l / ha	35 dni
azoksistrobin + ciprokonazol	Mirador xtra (staro Amistar Extra)(p)	0,6 – 1 l/ha	45 dni
tiofanat-metil	Topsin-M (p,t)	1,1 kg/ha	42 dni
metkonazol	Sirena (p)	1,5 l/ha	35 dni
	Caramba (p)	1,5 l/ha	35 dni
protiokonazol + tebukonazol	Prosaro (p, r, t) *2	1 l/ha	35 dni
tebukonazol	Tebusha 25 % EW (p)	1 l/ha	35 dni
	Orius (p)	1 l/ha	Čas uporabe
	Baltazar (p)	1 l/ha	42 dni
	Buzz Ultra (p)	0,33 kg/ha	35 dni
	Star Tebukonazol (j, t, r)	1 l/ha	42 dni
	Bounty (p)	0,6 l/ha	35 dni
biksafen + tebukonazol	Zantara (p, j, r, t)	1,5 l/ha	35 dni
biksafen + protiokonazol	Siltra xpro	1 l/ha	Čas uporabe
biksafen+ fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (p, t)	1,5 l/ha	Čas uporabe
difenokonazol+tebukonazol	Magnello (p)	1 l/ha	Čas uporabe
prokloraz + tebukonazol	Zamir (p)	1,5 l/ha	35 dni
azoksistrobin	Tazer 250 SC (p)	0,8 l/ha	35 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

Žitne uši - Prag za zatiranje žitnih uši v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v **sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas**. Za zatiranje žitnih uši lahko uporabimo:

AKTIVNA SNOV	PRIPRAVEK	ODMEREK	KARENCA
beta-ciflutrin	Bulldock EC 25 (p, j, o, t, r)	0,3 – 0,5 l/ha	21 dni
lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)	0,15 l/ha	30 dni
lambda-cihalotrin	Kaiso EG (p, j, o, t, r)	150 g/ha	30 dni
lambda-cihalotrin	Spariero (p, j, t, r)	0,075 l/ha	28 dni
	Karis 10 CS (p, j, o)	50 ml/ha	Čas uporabe
pirimikarb	Pirimor 50 WG (p, j, o, t, r)	0,3 kg / ha	35 dni
deltametrin	Decis 2,5 EC (p, j, o, t, r)	0,2 – 0,3 l/ha	30 dni
	Decis (p, j, o, t, r)	0,2 – 0,3 l/ha	30 dni
	Decis 100 EC (p, j, o)	63 ml/ha	30 dni
cipermetrin+ klorpirifos-metil	Daskor 440 (p, j, o, t, r)	0,625 l/ha	28 dni
flonikamid	Teppeki(p, t, r)	0,14 kg/ha	28 dni
tau-fluvalinat	Mavrik 240 (p, j, o, t, r)	0,2 l/ha	28 dni (p, r, t), 49 dni (j, o)
	Evure (p, j, o, t, r)	0,2 l/ha	28 dni (p, r, t), 49 dni (j, o)
tiaklopid	Biscaya (p, j, o, r, t)	0,3 l/ha	Čas uporabe
deltametrin	Poleci (p, j, o, t, r)	0,2 -0,3 l/ha	30 dni
dimetoat	Perfekthion (p, r, t)	0,5 l/ha	56 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

Na nekaterih posevkih žit še vedno opazamo močnejši pojav ličink žitnega strgača. Prag škodljivosti znaša ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m². Na posevkih žit, kjer zatiranje še ni bilo opravljeno opazamo poškodbe na zastavičarju. V primeru preseženega praga škodljivosti, lahko uporabite insekticide priporočane v OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED ŠKODLJIVCI z dne 10.5. 2019.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenju evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 23.05.2019 14:36

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

