

Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Krompir
/ 55. OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM

55. OBVESTILO O VARSTVO KROMPIRJA PRED KOLORADSKIM HROŠČEM - 31.05.2019 14:34 - Zaključeno



Opazili smo prva jajčeca koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo zaradi otoplitve intenzivno odlaganje jajčec, kakor tudi izleganje ličink. Zatirati je potrebno nižje razvojne stadije ličink, prag škodljivosti je presežen, ko so na več kot 20% grmov odložena jajčeca in je izleženih 10 - 15 % ličink. Letno uporabimo insekticide v krompirju dva do največ trikrat. Pomembno je, da vsakič uporabimo insekticid iz druge kemične skupine, ker hrošč hitro razvija rase odporne na insekticide.

Za zatiranje je mogoče uporabiti : Bulldock EC 25 0,5 l/ha, Mavrik 240 0,2l/ha, Evure 0,2 L/ha, Sparviero 0,075 l/ha, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 0,1 l/ha, Biscaya 0,3 l/ha, Coragen 0,06 l/ha, Alverde 0,25 l/ha, Raptol koncentrat 8 L/ha, Neemazal T/S 2,5 L/ha, Laser 240 SC 0,2 l/ha, Laser plus 0,04 L/ha, Daskor 440 0,75 L/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 31.05.2019 14:34

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

