

Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Krompir
/ 52. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA

52. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA - 07.06.2019 14:19 - Zaključeno



V posevkih krompirja smo opazili prve odrasle osebkke **koloradskega hrošča**, samice so tudi že začele z izleganjem jajčec. Odraslih hroščev običajno ne zatiramo. Ukrepati začnemo, ko imamo na več kot 20% grmov pred začetkom cvetenja razvitih 10 ličink prvega stadija / grm, ali ko imamo po višku cvetenja več kot 20 ličink na grm. Za zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **ACTARA 25 WG, ALVERDE, BISCAYA, BULLDOCK EC 25, CALYPSO SC 480, **CORAGEN, DASKOR 440, EVURE, LASER 240 SC, LASER PLUS, MAVRIK 240, MOSPILAN 20 SG** ali **SPARVIERO**.

V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek **NEEMAZAL T/S** ali pripravek na osnovi piretrina: **RAPTOL KONCENTRAT**. Letno skušamo insekticide uporabiti le dvakrat. Vsakič uporabite insekticid iz druge kemične skupine. Če uporabite dotikalne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. V primeru uporabe sistemskih sredstev krompir zaščitimo za 3 – 5 tednov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Datum objave obvestila: 07.06.2019 14:19

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

