

82. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 14.06.2019 08:59 - Zaključeno



V nasadih marelic se lahko razvije **navadna sadna gniloba**. Zato svetujemo, da srednje pozne in pozne sorte marelic škropite proti omenjeni bolezni. Za zatiranje lahko uporabite naslednje pripravke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Amylo-X	1,5-2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,6 kg/ha
Prolectus	400 g na višinski meter na ha; 1,2 kg/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Score 250 EC	0,03 %; 0,45 l/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha (na m višine krošnje); 0,75 kg/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Switch 62,5 WG	0,08%; 1 kg/ha (najvišji dovoljeni odmerek)

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Marelična pepelovka

Še vedno obstaja nevarnost pojava **marelične pepelovke**. Bolezen lahko zatirate s pripravki na osnovi **žvepla**, oz. z drugimi registriranimi sredstvi.

Registrirani pripravki za zatiranje marelične pepelovke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Biotip Sulfo 800 SC	6 l/ha
Cosan	5-7,5 kg/ha
Kumuluf DF	5-7,5 kg/ha
Microthiol Special	5-7,5 kg/ha
Pepelin	5-7,5 kg/ha
Pol-Sulphur 800 SC	6 l/ha
Score 250 EC	0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha
Sercadis	0,15 l/ha
Thiovit Jet	5-7,5 kg/ha
Vindex 80 WG	5-7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva na osnovi žvepla uporabljajte v hladnejšem delu dneva!

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024