



58. OBVESTILO ZA VARSTVO KAPUSNIC - 14.06.2019 12:39 - Zaključeno



Ugodne temperature ter povečana vlaga vplivajo na razvoj različnih gosenic na kapusnicah. V primeru da tudi sami opazite na svojem posevku 10 - 30 majhnih gosenic (kapusovega molja) ali 1 - 4 velike gosenice (kapusove sovke) na 10 rastlin, priporočamo zaščito posevka.

V primeru gosenic **kapusovega molja**, uporabite enega izmed naslednjih pripravkov:

- **AFFIRM** (v odmerku 1,5 kg/ha, uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači),
- **KARATE ZEON 5 CS** (v odmerku 0,15 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovtu, cvetači ali redkvici),
- **MIMIC** (v odmerku 0,3-0,4 l/ha uporaba na kapusnicah),
- **STEWART** (v odmerku 85 g/ha, uporaba na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju),
- **FASTAC 100 EC** (v odmerku 0,1 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu),
- **LEPINOX PLUS** (v odmerku 1 kg/ha, uporaba na brokoli, ohrovt, glavnatu zelje, kitajski kapus, brstični ohrovt),
- **DELFIN WG** (v odmerku 0,5 kg/ha, uporaba na kapusnicah),
- **NEEMAZAL – T/S** (v odmerku 3,0 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem),
- **DECIS 100 EC** (v odmerku 75 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu),
- **CORAGEN** (v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu),
- **AGREE** (v odmerku 1 kg/ha, na kapusnicah).

V primeru gosenic **kapusove sovke**, uporabite enega izmed naslednjih pripravkov:

- **KARATE ZEON 5 CS** (v odmerku 0,2 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovtu ali redkvici ali v odmerku 0,15 l/ha za uporaba na cvetači),
- **MIMIC** (v odmerku 0,3 – 0,4 l/ha, uporaba na kapusnicah),
- **STEWART** (v odmerku 85 g/ha, uporaba na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju),
- **AFFIRM** (v odmerku 1,5 kg/ha, uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači),
- **BULLDOCK EC 25** (v odmerku 0,3 – 0,5 l/ha, uporaba na glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu),
- **KARIS 10 CS** (v odmerku 50 ml/ha, uporaba na brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju vključno s sorto calabrese),
- **NEEMAZAL – T/S** (v odmerku 3,0 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem),
- **DELFIN WG** (v odmerku 0,5 kg/ha, uporaba na kapusnicah),
- **CORAGEN** (v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu),
- **AGREE** (v odmerku 1 kg/ha, na kapusnicah).

V primeru prerazmnožitve **kapusovih bolhačev** lahko posevke zaščitite s pripravki:

- **FASTAC 100 EC** (v odmerku 0,075 l/ha, uporaba v zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu),
- **KARATE ZEON 5 CS** (v odmerku 0,15 l/ha, na brstičnem ohrovtu, zelju, redkvici, cvetači, kitajskem zelju),
- **DECIS 100 EC** (v odmerku 63 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 14.06.2019 12:39

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

Seznam registriranih FFS

