

63. VARSTVO VINSKE TRTE - 27.06.2019 17:33 - Zaključeno



Vinska trta je zaključila s cvetenjem in oblikuje grozdice. Grozdne jagode dosegajo velikost prosenih zrn (72 – 73 po lestvici BBCH).

Svetujemo, da v aktualnem obdobju soparnih in vročih dni posebno pozornost namenite varstvu pred **oidijem vinske trte**. Na okužbe so dovzetni zlasti razvijajoči grozdčki do debeline grahovitih zrn. Priporočamo sredstva kot so: **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **CUSTODIA** (0,525 l/ha), **SPIROX D** (0,5 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 - 0,3 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha)...

Za varstvo pred **peronosporo vinske trte** pridejo v poštev uporabite kombinirane pripravke kot so: **REBOOT** (0,4 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (2,5 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FOLPAN GOLD** (staro ime RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE; 2,5 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (4 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,8 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), oz. **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha) ali **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha) ali **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (3 - 4 kg/ha)...

Upoštevajte, da visoke temperature ovirajo nanos in učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev. V kombinaciji s spodbujevalci rasti in listnimi gnojili **lahko pride do pojavov fitotoksičnosti**. Zaščito vinogradov opravite v večernem času, ko so temperature nižje in se izognete zanašanju. Razmike med tretiranjem prilagodite intenzivnosti priraščanja in morebitnim padavinam (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 8 dni.

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 27.06.2019 17:33

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

