



76. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 15 - 19.07.2019 12:18 - Zaključeno



Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 70 – 80% končne velikosti (BBCH 77-78).

Za preprečevanja okužb s **poznim škrlupom in skladiščnimi boleznimi** za zaključna škropljenja najbolj zgodnjih klonov sorte 'gala' in 'elstar' priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: **Amylo – X** (1,5-2,5 kg/ha) ali **Bellis** (0,8 kg/ha; karenca 7 dni) ali **Flint** (0,1-0,15 kg/ha; karenca 21 dni) ali **Geoxe** (0,45 kg/ha; karenca 3 dni) ali **Luna experience** (0,75 L/ha; karenca 14 dni) ali **Merpan 80 WDG** (1,88 kg/ha; karenca 28 dni) ali **Orthocide 80 WG** (2,0 kg/ha; karenca 28 dni) ali **Pomax** (1,6 L/ha; karenca 5 dni) ali **Scab 480 SC** (3,13 L/ha; karenca 21 dni) ali **Scab 80 WG** v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni) ali **Switch** 62,5 WG (1 kg; karenca 3 dni) ali **Vitisan** (2,5 kg/ha; karenca 1 dan) ali **Zato 50 WG** (0,1-0,15 kg/ha; karenca 21 dni) ali **Zato plus** (1,9 kg/ha; karenca 35 dni). **Upoštevajte korenče dobe !!!**

V nasadih **poznih sort** ('fuji', 'idared'...) je mogoče uporabiti enega od naslednjih fungicidov: **Merpan 80 WDG** v 1,88 kg/ha (karenca 28 dni), **Orthocide 80 WG** v 2,0 kg/ha (karenca 28 dni), **Scab 480 SC** v 3,13 L/ha (karenca 21 dni), **Scab 80 WG** v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni), **Zato plus** v 1,9 kg/ha (karenca 35 dni) ali **Zato 50 WG** ali **Flint** v odmerku 0,1 - 0,15 kg/ha (karenca 21 dni).

Za zatiranje jabolčnega zavijača v tem obdobju priporočamo uporabo enega izmed naslednjih insekticidov: **Affirm** v max. 4,0 kg/ha (karenca 7 dni) ali **Delegate 250 WG** v 0,3 kg/ha, (karenca 7 dni; **samo enkrat v rastni dobi !!!**) ali **Laser plus** v 0,3 L/ha (karenca 7 dni; **samo enkrat v rastni dobi !!!**)

V primeru **neurij s točo** priporočamo v nasadih uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**.

Opozarjamo na redno spremljanje pojava **hruševega ožiga**. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

Pri izbiri posameznega pripravka **upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj in karenčnih dob**, ki so navedene v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 19.07.2019 12:18

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MATKO Boštjan

Pripravil: **Boštjan Matko**

Seznam registriranih FFS

