



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Krompir

/ 65. OBVESTILO O DESIKACIJI-SUŠENJU KROMPIRJEVKE IN PLEVELOV PRED SPRAVILOM KROMPIRJA

65. OBVESTILO O DESIKACIJI-SUŠENJU KROMPIRJEVKE IN PLEVELOV PRED SPRAVILOM KROMPIRJA - 23.07.2019 14:48 - Zaključeno



Najmanj dva tedna pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevko in plevela lahko poškropite z enim od herbicidov **Reglone 200 SL**, **Dessicash 200 SL**, **Quad-glob 200 SL** vsi (a.s. dikvat), ali s herbicidom **Beloukha** (a.s. pelargonska kislina). Oba herbicida, Reglone 200 SL in Dessicash 200 SL, se uporabljata kot neselektivna herbicida na semenskem in jedilnem krompirju za sušenje (desikacijo) krompirjevke. Sredstvi delujeta na zelene dele rastlin krompirja hitro in že v nekaj dneh posušita krompirjevko in plevel (proti dežju sta odporna že 15 minut po škropljenju). **Reglone 200 SL** se za sušenje krompirjevke jedilnega krompirja uporablja v odmerku 2,5 L/ha (25 ml na 100 m²), za sušenje krompirjevke semenskega krompirja v odmerku 4 L/ha (40 ml na 100 m²), vedno ob porabi vode 300-400 L/ha, odvisno od bujnosti krompirjevke. V primeru, da je krompirjeva plesen prisotna v nasadu, lahko 14 dni pred izkopom uporabite kombinacijo Shirlan 500 SC (0,3-0,4 L/ha) + **Reglone 200 SL** (2,5 L/ha). **Dessicash 200 SL** se uporablja za sušenje krompirjevke na semenskem in jedilnem krompirju v odmerku 4L/ha, vedno ob porabi vode 200-600 L/ha, odvisno od bujnosti krompirjevke. Za oba velja, da škropite v času, ko imajo gomolji želeno debelino in čvrsto kožico, oziroma 14 dni preden se krompir izkoplje in skladišči. Karenta za Reglone 200 SL in Dessicash 200 SL je 10 dni! Desikacijo z Reglonom 200 SL ali z Dessicash 200 SL je potrebno opraviti v jasnem, suhem in ne prevročem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlagjo!

Herbicid **Quad-glob 200 SL** se uporablja v krompirju za sušenje krompirjevke, da se olajša strojno pobiranje krompirja. Priporočen odmerek je 2 L/ha ob porabi 200-300 L vode/ha. Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji željeno debelino oziroma najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira samo v primeru, ko je zagotovljeno strojno spravilo krompirja. Tretiranje se priporoča v času, ko je krompirjevka čvrsta (najbolje 6 ur po dežju, v jutranjih urah in ko je listje suho. Karenta za Quad-glob 200 SL za krompir je 14 dni!

Sredstvo **Beloukha** se v krompirju uporablja za sušenje krompirjevke v odmerku 16 L/ha, priporočena poraba vode je 200-300 L/ha. Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji želeno debelino oziroma najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmiku 5-7 dni. Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva Beloukha zmulči na višino 15-20 cm. Predhodno mulčenje je potrebno, da aktivna snov (pelargonska kislina) lažje prodre v listno maso. Uporaba sredstva v krompirju omogoči enakomernejše dozorevanje pridelka, lažje ločevanje cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj umazan pridelek. Kožica gomoljev je čvrstejša, kar pomeni manj poškodb med izkopom in manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo. Karenta za Beloukha za krompir je zagotovljena s časom uporabe!

Pred uporabo navedenih FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite desikacijo v skladu s predpisanimi navodili!

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih pred spravilom otrdi.

Datum objave obvestila: 23.07.2019 14:48

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

