



78. OBVESTILI O VARSTVU FIŽOLA PRED BOLEZNIMI - 20.09.2019 12:43 - Zaključeno



Fižolova rja

Ponovno beležimo pojav fižolove rje (*Uromyces appendiculatus*). Bolezenske znake opazamo tako na listih kot tudi na strokih fižola. Pridelovalcem fižola svetujemo varstvo fižola z enim od fungicidov: **Cuprablau Z 50 WP** (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), **Ortiva** ali **Zaftra AZT 250 SC** ali **Mirador 250 SC** (sistemični fungicidi s preventivnim in kurativnim delovanjem, v fižolu za stročje ali zrnje (suho ali sveže), 1 L/ha; K = 7 dni; dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni) ali **Signum** (preventivni fungicid s sistemskim delovanjem, 1 kg/ha; K = 21 dni, dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni; delno zatira tudi sivo plesen (*Botrytis* spp.)).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte! Pazite na karencne dobe!

Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu

V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah še vedno beležimo tudi pojav fižolovega ožiga (*Colletotrichum lindemuthianum*), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih, predvsem pa na strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili močnejši pojav listnih pegavosti na fižolu (*Mychosphaerella* spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo pri listni pegavosti fižola manj vdrtne pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: **Cuprablau Z 35 WG** (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,66-1,5 kg/ha; največ 5-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), **Cuprablau Z 50 WP** (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), **Switch 62,5** ima kombinirano kontaktno in sistemsko delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na listno pegavost na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). Za zmanjševanje okužb pegavosti iz rodu *Mychosphaerella* priporočamo, v fižolu za stročje ali zrnje (suho ali sveže), uporabo fungicidov **Ortiva** ali **Zaftra AZT 250 SC** ali **Mirador 250 SC** (sistemični fungicidi; odmerek 1 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za fižol za stročje, K = 14 dni za fižol za zrnje).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte! Pazite na karencne dobe!

Datum objave obvestila: 20.09.2019 12:43

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

