

5. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV - 06.03.2020 13:44 - Zaključeno



Češnje, višnje in slive so v razvojni stopnji nabrekanja cvetnih brstov (51-54 po lestvici BBCH).

V nasadih češenj, višenj in sliv svetujemo pred začetkom razpiranja brstov preventivno zaščito z bakrovimi pripravki. Slednji učinkujejo na različna glivična in bakterijska obolenja. Proti **listni luknjičavosti koščičarjev** delujejo **BADGE WG** (3,5 kg/ha; tudi proti češpljevi metličavosti, oz. rožičavosti češpelj), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2 kg/ha; tudi proti češnjevi listni pegavosti in raznim ožigom), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2 – 3 kg/ha; tudi proti raznim ožigom in češpljevi metličavosti, oz. rožičavosti češpelj).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 06.03.2020 13:44

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

