

14. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 06.03.2020 14:20 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmata carpophila*)

V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti **listni luknjičavosti koščičarjev**. Za zatiranje bolezni je dovoljena uporaba registriranih bakrovih sredstev.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2 - 3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 - 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Na sončnih legah zgodnje sorte sliv prehajajo v fenofazo cvetenja (BBCH 60 ali E po Baggoliniju). **Cvetno monilijo** na slivah in češpljah lahko zatirate s sredstvi, ki so navedena v spodnji preglednici.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Anylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 06.03.2020 14:20

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

