

18. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 17.03.2020 14:33 - Zaključeno



Akarinoza (*Calepitrimerus vitis*), erinoza (*Colomerus vitis*) in oidij vinske trte (*Uncinula necator*)

Na južnih legah so zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) v fenofazi B-C po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 01-09 po BBCH lestvici. Za zatiranje **pršice trsne kodravosti** in **trsne listne pršice šiškarice** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol Special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 17.03.2020 14:33

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

