



23. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 27.03.2020 10:55 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Nasadi zgodnjih sort češenj in višenj začenjajo cveteti (fenofaza 60 BBCH ali E po Baggioliniju). Ko bo odprtih 10 % cvetov je potrebno opraviti škropljenje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite registrirane pripravke, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Anylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Duaxo koncentrat	V odmerku 15 ml/5l vode oziroma v odmerku 1,1 l na višinski meter krošnje/ha. Najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3 l/ha.
Luna experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha
Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha
Teldor SC 500	0,5 l/ha na 1 m višine krošnje na ha (največji skupni odmerek 1,5 l na ha)
Zenby	0,9 l/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 27.03.2020 10:55

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

