



21. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 02.04.2020 14:45 - Zaključeno



Na izpostavljenih legah Celjske regije zgodnje sorte češenj na šibkih podlagah začenjajo cveteti. Pozne sorte češenj in višenj so še v fenološki fazi BBCH 54-55. Spremljajte razvoj in stanje cvetnih brstov ter cvetov. V primeru, da ti niso v celoti pozebli opravite škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko bo odprtih 10 % cvetov.

Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov kot so: **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha) ali **Duaxo koncentrat** (1,1 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 3,3 L/ha) ali **Zenby** (0,9 L/ha) Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* **Amilo -X** (1,5 - 2,5 kg/ha), ki ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Samo za češnje pa lahko proti cvetni moniliji uporabite tudi pripravke kot so: **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1,5 L/ha) ali **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus subtilis* **Serenade ASO** (8 L/ha), ki ima prav tako dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 02.04.2020 14:45

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

