

24. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 03.04.2020 13:49 - Zaključeno



Akarinoza (*Calepitrimerus vitis*), erinoza (*Colomerus vitis*), rumena ali gabrova pršica (*Eotetranychus carpini*), oidij vinske trte (*Uncinula necator*) in črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*)

Zgodnje sorte vinske trte so v fenofazi B-C po Baggolini-ju oziroma v fenofazi 01-09 po BBCH lestvici. Za zatiranje **pršice trsne kodravosti** in **trsne listne pršice šiškarice** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol Special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

V vinogradih, kjer se je v prejšnjih letih pojavljala **gabrova pršica** ali **rdeča sadna pršica** se v fenološki fazi BBCH 03 (konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni) lahko škropi s pripravkom **Red Fox** v odmerku 15 l/ha. Z uporabo omenjenega sredstva v odmerku 25-30 l/ha zmanjšamo okužbe s **črno pegavostjo vinske trte**.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Pred uporabo pripravkov, ki so nevarni čebelarjem, je potrebno pokositi cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Datum objave obvestila: 03.04.2020 13:49

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

